

**Exercice 1 (3 points)**

Deux frères travaillent dans deux régions différentes, loin de leur maison. Le premier a quitté la maison le Dimanche 06 Mars 2022 et il retourne à la maison tous les 8 jours. Le deuxième a quitté la maison le 22 Mars 2022 (16 jours après le premier) et il retourne à la maison tous les 12 jours. A chaque retour, ils restent une matinée à la maison avant de repartir.

- |   |        |
|---|--------|
| 1.a) Déterminer la plus proche date où les deux frères vont se retrouver ensemble à la maison.  | 0,5pt  |
| b) Vérifier que c'est un vendredi.  | 0,25pt |
| 2° On considère l'équation (E) : $2x - 3y = 4$ où x et y sont des entiers naturels.   |        |
| a) Vérifier que le couple (5;2) est une solution particulière de (E).   | 0,5pt  |
| b) Résoudre (E).  | 1 pt   |
| 3° Déduire le nombre de rencontres des deux frères à la maison dans la période du 3 Mars 2022 au 3 Mars 2023. Parmi ces rencontres, combien auront lieu en vendredi ? | 0,75pt |

**Exercice 2 (3 points)**

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  on considère les vecteurs  $\vec{u}(2;2;1)$ ,  $\vec{v}(1;2;-1)$  et  $\vec{n}(-3;2;2)$  et les points  $A(0;0;1)$  et  $B(0;1;-1)$ .

- |  |       |
|--|-------|
| 1.a) Déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$                            | 1pt   |
| b) Montrer que $-4x + 3y + 2z - 1 = 0$ est une équation du plan Q passant par B et dont $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base. | 0,5pt |

2° On considère les matrices  $M = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ -4 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$  et  $N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ .

- |   |       |
|---|-------|
| a) Montrer que $M \times N = I_3$   | 1pt   |
| b) En déduire l'ensemble de solution du système $\begin{cases} -3x + 2y + 2z = 2 \\ -4x + 3y + 2z = 1 \\ 2x - y - z = -3 \end{cases}$ | 0,5pt |

**Exercice 3 (4 points)**

ABCD est un losange tel que  $(\overline{AB}, \overline{AD}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ , E et F sont les symétriques de A,

respectivement, par rapport à B et D.

- |   |        |
|---|--------|
| 1.a) Faire une figure illustrant les données de l'exercice.   | 0.5 pt |
| b) Montrer que le triangle AEF est équilatéral direct.  | 0.5 pt |
| 2° Soit f une isométrie qui transforme D en B et F en E.  |        |
| a) On suppose que f est un antidéplacement. Déterminer sa nature et le caractériser.  | 0.5 pt |
| b) On suppose que f est un déplacement. Montrer que f est une rotation (qu'on notera par la suite r) et préciser ses éléments caractéristiques. | 0.5 pt |
| 3.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe s qui transforme A en E et F en C.  | 0.25pt |
| b) Déterminer le rapport et une mesure de l'angle de s.   | 0.5pt  |
| c) Montrer que le centre I de s appartient au cercle circonscrit au triangle AEF.   | 0.5 pt |
| d) Montrer que I appartient à la droite (AC). Placer le point I.  | 0.25pt |
| 4° Soit $h = s \circ r$ où r est la rotation définie dans la question 2°b).   |        |
| a) Montrer que h est une homothétie et déterminer son rapport.  | 0.25pt |
| b) Déduire que le centre $\Omega$ de h est le barycentre du système $\{(A,1);(E,-2)\}$ . Placer $\Omega$ .                                      | 0.25pt |

**Exercice 4 (5 points)**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$ . On note  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

- 1.a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ , interpréter graphiquement cette limite. 0,5pt
- b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ , interpréter graphiquement ce résultat. 0,75pt
- 2.a) Calculer  $f'(x)$  et dresser le tableau de variation de  $f$ . 0,75pt
- b) Montrer que  $f$  admet une fonction réciproque, notée  $f^{-1}$ , définie sur un intervalle à préciser. 0,25pt
- c) Dresser le tableau de variation de  $f^{-1}$ . 0,25pt
- 3.a) Montrer que la courbe  $(C)$  admet deux points d'inflexion à préciser. 0,5pt
- b) Déterminer une équation de la tangente  $T$  à  $(C)$  au point d'abscisse 0. 0,5pt
- c) Construire  $T$ ,  $(C)$  et  $(C')$ ,  $(C')$  étant la courbe représentative de  $f^{-1}$ . 0,5pt
- 4.a) Soit  $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ . Déterminer  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que  $F$  soit une primitive de  $f$ . 0,5pt
- b) Montrer que la suite de terme général  $u_n = \int_0^n f(x)dx$  est croissante puis exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ . 0,5pt

**Exercice 5 (5 points)**

1° Soit  $f$  la fonction définie sur  $I = ]0;1]$  par  $f(x) = (1-x)^2 \ln x$  et soit  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 2 cm.

- a) Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  puis interpréter graphiquement le résultat. 0,5pt
- b) Etudier la dérivabilité de  $f$  à gauche de 1 et interpréter graphiquement. 0,5pt
- c) Montrer que  $\forall x \in I, f'(x) \geq 0$  puis dresser le tableau de variation de  $f$ . 0,75pt
- d) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur un intervalle  $J$  à déterminer. 0,5pt
- e) Tracer, dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , les courbes  $\Gamma$  et  $\Gamma'$ , ( $\Gamma'$  étant la courbe représentative de  $f^{-1}$ ) 0,5pt

2° Pour tout entier naturel  $n$  non nul, on définit la fonction  $f_n$  sur  $I = ]0;1]$  par

$$f_n(x) = (1-x)^n \ln x. \text{ On pose } F_n(x) = \int_x^1 f_n(t)dt, x \in I$$

- a) En utilisant une intégration par parties, montrer que pour tout  $x$  de  $I$ , on a : 0,75pt

$$F_n(x) = \frac{(1-x)^{n+1} \ln x}{n+1} + \frac{1}{n+1} \int_x^1 \frac{(1-t)^{n+1}}{t} dt$$

- b) Vérifier que  $\forall t \in ]0;1], 1 + (1-t) + (1-t)^2 + (1-t)^3 + \dots + (1-t)^n = \frac{1 - (1-t)^{n+1}}{t}$  0,5pt

- c) Dédire que pour tout  $x$  de  $I$ ,  $\int_x^1 \frac{(1-t)^{n+1}}{t} dt = -\ln x - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} (1-x)^{k+1}$  0,5pt

- d) Dédire que pour tout  $x$  de  $I$ ,  $(n+1)F_n(x) = (-1 + (1-x)^{n+1}) \ln x - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(1-x)^k}{k}$  0,5pt

Fin.