

**Exercice 1 (3 points)**

On considère l'équation (E) :  $11x+9y=19$  , où  $x$  et  $y$  sont des entiers relatifs.

1.a) Vérifier que  $(-4,7)$  est une solution particulière de (E).

b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E).

**2) Uniquement , pour la série C**

Une variable aléatoire réelle  $X$  ne prend que trois valeurs :  $-4, 7$  et  $8$ , avec les probabilités respectives:

$$p_1 = \frac{x-4}{9}, p_2 = \frac{2x-y-8}{9}, p_3 = \frac{8x+10y+2}{9}.$$

a) Démontrer qu'il existe un unique couple d'entiers  $(x, y)$  tel que ces coordonnées soient acceptables. Préciser le.

b) Montrer que l'espérance mathématique de  $X$  est  $E(X) = 6$ .

c) Calculer la variance de  $X$ .

**2.bis) Uniquement , pour la série TMGM**

On considère l'équation (E') :  $(11-9i)z+(11+9i)\bar{z}=38$ , d'inconnue complexe.  $\bar{z}$  désigne le conjugué de  $z$ .

a) Soit  $M(x,y)$  un point d'affixe  $z$  où  $z$  est une solution de (E'). Montrer que l'équation (E') admet une infinité de solutions et déterminer le lieu géométrique  $\Delta$  des points  $M(x,y)$ .

b) Quels sont les points  $M(x,y)$  de  $\Delta$  dont les coordonnées sont des entiers relatifs ?

**Exercice 2 (4 points)**

1) Dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$ , on pose:  $P(z) = z^3 + (2-2i)z^2 + (-2-8i)z - 8 + 4i$ .

a) Calculer  $P(2i)$ .

b) Résoudre l'équation  $P(z) = 0$ .

2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , on considère la transformation

$$f \text{ d'expression : } z' = \frac{1}{3}iz + \frac{2}{3} + 2i.$$

a) Montrer que  $f$  est une similitude directe. Préciser le centre  $A$ , le rapport et un angle de  $f$ .

b) Calculer l'affixe  $z_C$  du point  $C$  image de  $B(-3,-1)$  par  $f$ . Placer les points  $A, B$  et  $C$  sur la figure et montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle.

c) Calculer l'affixe  $z_G$  du point  $G$  barycentre du système  $S = \{(A,-4); (B,1); (C,6)\}$ . Vérifier que les points  $A, B, C$  et  $G$  sont cocycliques.

3) Déterminer puis construire les ensembles  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  des points  $M$  du plan définis par :

a)  $M \in \Gamma_1 \Leftrightarrow -4MA^2 + MB^2 + 6MC^2 = 30$

b)  $M \in \Gamma_2 \Leftrightarrow MB^2 - MC^2 = 16$ .

**Exercice 3 (4 points)**

1) Soit  $g$  la fonction définie sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  par :  $g(x) = -x^2 - \ln x$ .

a) Dresser le tableau de variation de  $g$ .

b) Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet dans  $]0; +\infty[$  une unique solution  $\alpha$ . Vérifier que

$$\frac{1}{e} < \alpha < 1. \text{ En déduire le signe de } g(x).$$

2) Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  par :  $f(x) = -x + 1 + \frac{1}{x}(1 + \ln x)$ .

a) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ . Interpréter graphiquement. (0,25 pt)

b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (1-x))$ . Interpréter graphiquement. (0,25 pt)

c) Vérifier que  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  et dresser le tableau de variation de  $f$ . (0,75 pt)

d) Construire la courbe représentative de  $f$ . (0,25 pt)

3) Soit  $f_m$  la fonction définie sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  par :  $f_m(x) = -x + 1 + \frac{m^2}{x}(1 + \ln x - \ln m)$ , où  $m$  est un paramètre réel strictement positif.

a) Montrer que les courbes  $(C_m)$  représentatives des fonctions  $f_m$  dans un repère cartésien, admettent les mêmes asymptotes, dont on précisera le point d'intersection, noté  $G$ . (0,5 pt)

b) Montrer que  $(C_m)$  est l'image de  $(C_1)$  par une homothétie de centre  $G$  dont on précisera le rapport. (0,5 pt)

c) Dédurre le tableau de variation de  $f_m$  à partir de celui de  $f$ . (0,25 pt)

#### Exercice 4 (5 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle  $ABC$  équilatéral direct de centre  $O$  et de côté  $a$ , ( $a > 0$ ).

Soient  $I, J$  et  $K$  les milieux respectifs des segments  $[BC], [CA]$  et  $[AB]$

L'objectif de cet exercice est l'étude de quelques propriétés de la configuration précédente.

1.a) Faire une figure illustrant les données précédentes que l'on complétera au fur et à mesure. (On pourra prendre la droite  $(AB)$  horizontale) (0,75 pt)

b) Montrer qu'il existe une unique rotation  $r_1$  qui transforme  $A$  en  $B$  et  $C$  en  $A$ . (0,5 pt)

c) Déterminer un angle de  $r_1$  et préciser son centre. (0,5 pt)

d) On considère la rotation  $r_2$  de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ . Déterminer  $r_1 \circ r_2(B)$  et caractériser  $r_1 \circ r_2$ . (0,5 pt)

2) On considère les points  $D$  et  $E$  symétriques respectifs de  $I$  et  $J$  par rapport à  $K$ .

a) Montrer qu'il existe un unique antidéplacement  $g$  qui transforme  $A$  en  $K$  et  $J$  en  $E$ . (0,5 pt)

b) Justifier que  $g$  est une symétrie glissante. Déterminer  $g(D)$  et donner la forme réduite de  $g$ . (0,5 pt)

4.a) Montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s_1$  qui transforme  $B$  en  $I$  et  $C$  en  $J$ . (0,25 pt)

b) Déterminer le rapport et un angle de  $s_1$ . Justifier que  $O$  est le centre de  $s_1$ . (0,5 pt)

5) On considère les points  $M \in [BC]$ ,  $N \in [CA]$ ,  $P \in [AB]$ , tels que  $BM = CN = AP = x$ ,  $x \in [0, a]$ .

a) Montrer que le triangle  $MNP$  est équilatéral et de centre  $O$ . (0,25 pt)

b) Soit  $H$  le milieu de  $[MN]$ . Déterminer le lieu géométrique de  $H$  lorsque  $M$  décrit  $[BC]$ . (0,25 pt)

c) A partir d'une position donnée de  $M$  sur  $[BC]$ , montrer qu'il existe une unique similitude directe  $s_2$  qui transforme  $(A, B, C)$  en  $(P, M, N)$ . Préciser son centre. (0,25 pt)

d) Préciser la position de  $M$  sur  $[BC]$  pour laquelle, le quotient  $\lambda = \frac{OM}{OB}$  est minimal. En déduire la position de  $M$  sur  $[BC]$  pour laquelle l'aire du triangle  $MNP$  est minimale. (0,25 pt)

#### Exercice 5 (4 points)

On considère la fonction numérique  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{e^x}{e^x - x}$ .

Soit  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un nouveau repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1.a) Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ . Donner une interprétation graphique. (0,5 pt)

- b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ . Donner une interprétation graphique. (0,5 pt)
- c) Dresser le tableau de variation de  $f$  et construire sa courbe  $\Gamma$ , (On remarquera que le domaine de définition de  $f$  est  $\mathbb{R}$ ). (0,75 pt)
- 2) Soit  $A$  l'aire du domaine plan limité par la courbe  $\Gamma$ , l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x=0$  et  $x=1$ .  
 Montrer que  $1 \leq A \leq \frac{e}{e-1}$ . On ne cherche pas à calculer la valeur exacte de  $A$ . (0,25 pt)
- 3) Pour tout entier naturel  $n$ , on pose:  $I_n = \int_0^1 x^n e^{-nx} dx$ , pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ; et  $I_0 = 1$
- a) Montrer que  $I_1 = 1 - 2e^{-1}$ , (On pourra utiliser une intégration par parties). (0,5 pt)
- b) Montrer que pour tout entier naturel  $n > 1$  on a,  $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ . En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$ . (0,5 pt)
- 4) On pose pour tout entier naturel  $n$ :  $S_n = I_0 + I_1 + \dots + I_n$ .
- a) Justifier que :  $S_n = \int_0^1 \frac{1 - (xe^{-x})^{n+1}}{1 - xe^{-x}} dx$ . (0,25 pt)
- b) Montrer que :  $A - S_n = \int_0^1 \frac{(xe^{-x})^{n+1}}{1 - xe^{-x}} dx$ . (0,25 pt)
- c) Montrer que :  $0 \leq A - S_n \leq \frac{2}{n+2}$ . En déduire que :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = A$ . (0,25 pt)
- d) Déterminer un entier naturel  $n_0$  tel que pour tout  $n > n_0$ ,  $A$  soit une valeur approchée de  $S_n$  à  $10^{-2}$  près. (0,25 pt)

Fin.